







2011

Recommended Immunizations for Babies

 at birth	HepB	
 2 months	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 1-2 mos	
 4 months	DTaP + PCV + Hib + Polio + RV	
 6 months	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 6-18 mos*	(Influenza) 6 mos through 18 years**
 12 months	MMR + PCV + Hib + Varicella + HepA 12-15 mos* 12-15 mos* 12-15 mos* 12-15 mos* 12-23 mos*	(Influenza) 6 mos through 18 years**
 15 months	DTaP 15-18 mos*	(Influenza) 6 mos through 18 years**

Vaccine Descriptions:

HepB: protects against hepatitis B

DTaP: a combined vaccine that protects against diphtheria, tetanus, and pertussis (whooping cough)

Hib: protects against *Haemophilus influenzae* type b

PCV: protects against pneumococcal disease

Polio: protects against polio, the vaccine is also known as IPV

RV: protects against infections caused by rotavirus

Influenza: protects against influenza (flu)

MMR: protects against measles, mumps, and rubella (German measles)

Varicella: protects against varicella, also known as chickenpox

HepA: protects against hepatitis A

NOTE: If your child misses a shot, you don't need to start over, just go back to your doctor for the next shot. The doctor will help you keep your child up-to-date on his or her vaccinations.

* This is the age range in which this vaccine should be given.

** Children 6 months or older should receive flu vaccination every flu season. If this is the first time for flu vaccine, a child 6 months through 8 years of age should receive two doses, separated by at least 4 weeks. If this child only receives one dose in the first season, he or she should receive two doses the next season, if still younger than 9 years. Ask your child's doctor if a second dose is needed.

For more information, call toll free 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) or visit <http://www.cdc.gov/vaccines>







The recommended immunization schedules for children birth through 18 years old are approved by the Centers for Disease Control and Prevention (<http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip>), the American Academy of Pediatrics (<http://www.aap.org>), and the American Academy of Family Physicians (<http://www.aafp.org>).



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

2011

Vacunas recomendadas para bebés

 al nacer	HepB		
 2 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 1-2 meses		
 4 meses	DTaP + PCV + Hib + Polio + RV		
 6 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 6-18 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**	
 12 meses	MMR + PCV + Hib + Varicela + HepA 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-23 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**	
 15 meses	DTaP 15-18 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**	

Descripción de las vacunas:

- HepB:** protege contra la infección por el virus de la hepatitis B
- DTaP:** protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina
- Hib:** protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana
- PCV:** protege contra la infección neumocócica
- Polio:** protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV
- RV:** protege contra las infecciones causadas por el rotavirus
- Influenza:** protege contra la influenza (gripe)
- MMR:** protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)
- Varicela:** protege contra la varicela
- HepA:** protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

NOTA: Si le falta una vacuna, a su niño, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de su niño.

- * Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.
- ** Se recomienda que todos los niños de 6 meses a 8 años reciban 2 dosis de la vacuna contra la gripe 2010-11 con un intervalo de 4 o más semanas **a menos que** hayan recibido:
 1. al menos 1 dosis de la vacuna contra la gripe H1N1 2009 durante la última temporada de gripe, **y**
 2. al menos 1 dosis de la vacuna contra la gripe de temporada **antes** de la temporada de gripe 2009-2010 o 2 dosis de la vacuna contra la gripe de temporada 2009-10 durante la última temporada de gripe
 Si el niño ha cumplido con ambos requisitos, solamente necesita 1 dosis de la vacuna contra la gripe 2010-11.

Para más información, llame gratis al **1-800-232-4636**
o visite <http://www.cdc.gov/vaccines>

Los calendarios de vacunación recomendados para los niños del nacimiento hasta los 18 años de edad están aprobados por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (<http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip>), la Academia Americana de Pediatría (<http://www.aap.org>) y la Academia Americana de Médicos de Familia (<http://www.aafp.org>).



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention